

令和 5 年 3 月 20 日

会員各位

医療用医薬品に対応する OTC 医薬品のリスト作成（湿布剤）

一般社団法人日本医薬品情報学会
OTC 情報委員会

わが国では国民医療費が圧迫されており、セルフメディケーションの推進が求められています。消費者が OTC 医薬品を選択する際、使い慣れた医療用湿布剤と同様の使用感を求める傾向にあります。

そこで、当委員会では薬局薬剤師が消費者の求めに応じた OTC 医薬品を提供できるようにするため、医療用医薬品に対応する OTC 医薬品のリストを作成しました。このリストは主成分をもとに作成し、それら OTC 医薬品の代表的な使用上の注意及び特徴をまとめました。適正なセルフメディケーションの推進にお役立てください。

なお、本資料は 2022 年 12 月 21 日の時点で、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへ掲載されていた情報に基づいています。

医療用医薬品に対応する OTC 医薬品のリスト(湿布剤)

一般社団法人日本医薬品情報学会

有効成分	<医療用医薬品>		<一般用医薬品>						
	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
インドメタシン	イドメシンコーワパップ 70mg(興和) ----- インサイドパップ 70mg(久光製薬) ----- カトレップテープ 35mg、テープ 70mg、 カトレップパップ 70mg (帝國製薬)	バンテリンコーワパップ、バンテリンコーワパップ EX(興和)	膏体 100g 中 1g	7×10cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人		1-メントール
		バンテリンコーワパップ EX ホット(興和)	膏体 100g 中 1g	7×10cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人	温感	1-メントール、トウガラシエキス
		バンテリンコーワパップ S(興和)	膏体 100g 中 0.5g	14×10cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人		1-メントール
		バンテリンコーワパップホット(興和)	膏体 100g 中 0.5g	14×10cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人	温感	1-メントール、トウガラシエキス
		オムニード ID プラスター3.75M(帝國製薬)	膏体 100g(1m)中 3.75g	7×10cm1 枚	11 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人		1-メントール
		テイプラスターID(帝國製薬)	膏体 100g(1m)中 3.75g	7×10cm1 枚	11 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人		1-メントール
		サロンパス EX(久光製薬)	膏体 100g 中 3.5g	5.4×8.56cm1 枚	11 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人	微香性	1-メントール
		バンテリンコーワパップ、バンテリンコーワパップ EX(興和)	膏体 100g 中 1g	7×10cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 2 回まで(連続して 2 週間以上使用しない)	ぜんそくを起したことがある人		1-メントール
エスフルルビプロフェン	ロコアテープ(大正製薬)	該当商品なし							

有効成分	<医療用医薬品>		<一般用医薬品>						
	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
ケトプロフェン	モーラスパップ 30mg、パップ 60mg (久光製薬)	オムニードケトプロ フェンパップ(帝國 製薬)	膏体 100g(1400cm)中 0.3g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (使用中及び使用 後少なくとも 4 週 間は貼付部を紫 外線にあてない)	・妊婦又は妊娠 していると思わ れる人 ・ぜんそくを起こ したことがある人 ・チアプロフェン 酸を含有する解 熱鎮痛薬, スプ ロフェンを含有 する外用鎮痛 消炎薬, フェノ フィブラートを含 有する高脂血 症治療薬		l-メントール
	モーラスパップ XR120mg、パップ XR240mg モーラステープ 20mg、テープ L40mg (久光製薬)								
	ミルタックスパップ 30mg(ニプロファーマ)								
サリチル酸メチル	ラクール冷シップ、温 シップ(東光薬品工 業) ----- MS 冷シップ「タイホ ウ」、MS 温シップ「タイ ホウ」(岡山大鵬薬品)	コーホーパス S α (大石膏盛堂)	膏体 100g 中 10g			1 日数回			l-メントール
		ラクール C(東光薬 品工業)	膏体 100g 中 0.5g			1 日 1～2 回			l-メントール
		ラクール H(東光薬 品工業)	膏体 100g 中 1g			1 日 1～2 回		温感	トウガラシエキ ス
		ビーエスバン S α (大石膏盛堂)	膏体 100g 中 10g	7.2×4.6cm1 枚		1 日数回			l-メントール
		ゴールドパス(大協 薬品工業)	膏体 100g 中 10g	7×5cm1 枚		1 日 1～2 回			l-メントール
		ピタコリ Z(大協薬 品工業)	膏体 100g 中 10g	7×5cm1 枚		1 日数回			l-メントール
		ワイドソフトパス(大 協薬品工業)	膏体 100g 中 10g	7×5cm1 枚		1 日数回			l-メントール
		サロンパス(久光製 薬)	膏体 100g 中 10g	4.6×7.2cm1 枚		1 日数回			l-メントール

	<医療用医薬品>		<一般用医薬品>						
有効成分	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
ジクロフェナクナトリウム	ナボルテープ 15mg、テープ L30mg、ナボルパップ 70mg、パップ 140mg(久光製薬) ----- ボルタレンテープ 15mg、テープ 30mg(同仁医薬化工)	ボルタレン AC α テープ、AC α テープ L(同仁医薬化工)	膏体 100g 中 1g	7×10cm1 枚、L:10×14cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 1 回 1～2 枚(L は 1 日 1 回 1 枚貼付) ・1 回あたり 2 枚を超えて使用しない(L は 1 回あたり 1 枚を超えて使用しない) ・1 回あたり 24 時間を超えて貼り続け ない ・連続して 2 週間以上使用しない	・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・ぜんそくを起こしたことがある人	1 日 1 回で 24 時間効く。 無香料	
		ボルタレン EX テープ、EX テープ L(同仁医薬化工)	膏体 100g 中 1g	7×10cm1 枚、L:10×14cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 1 回 1～2 枚(L は 1 日 1 回 1 枚貼付) ・1 回あたり 2 枚を超えて使用しない(L は 1 回あたり 1 枚を超えて使用しない) ・1 回あたり 24 時間を超えて貼り続け ない ・連続して 2 週間以上使用しない	・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・ぜんそくを起こしたことがある人	1 日 1 回で 24 時間効く。 無香料	
		フェイタス Z α ジクサス、大判(久光製薬)	膏体 100g 中 2g	7×10cm1 枚、大判:10×14cm1 枚	15 才未満は使用しない	1 日 1 回 1～2 枚(大判は 1 日 1 回 1 枚貼付) ・1 回あたり 2 枚を超えて使用しない(大判は 1 回あたり 1 枚を超えて使用しない) ・1 回あたり 24 時間を超えて貼り続け ない ・連続して 2 週間以上使用しない	・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・ぜんそくを起こしたことがある人	1 日 1 回。 微香性	l-メントール

	<医療用医薬品>		<一般用医薬品>						
有効成分	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
(続き) ジクロフェナクナトリウム	(続き) ナボルテープ 15mg、テープ L30mg、ナボルパ ップ 70mg、パップ 140mg(久光製薬) ----- ボルタレンテープ 15mg、テープ 30mg (同仁医薬化工)	フェイタスZαジク サス温感、Zαジ クサス温感 大判 (久光製薬)	膏体 100g 中 2g	7×10cm1 枚、 大判:10× 14cm1 枚	15 才未満 は使用しな い	1 日 1 回 1～2 枚 (大判は 1 日 1 回 1 枚貼付) ・1 回あたり 2 枚を 超えて使用しない (大判は 1 回あた り 1 枚を超えて使 用しない) ・1 回あたり 24 時 間を超えて貼り続 けない ・連続して 2 週間 以上使用しない	・妊婦又は妊娠 していると思わ れる人 ・ぜんそくを起こ したことがある 人	1 日 1 回。 温感 微香性	l-メントール、ノ ニル酸ワニリ ルアミド
		フェイタスZジク サスシップ(久光 製薬)	膏体 100g 中 1g	10×14cm1 枚	15 才未満 は使用しな い	1 日 1 回 1～2 枚 (1 回あたり 2 枚ま で) (1 回あたり 24 時 間を超えて貼り続 けない) (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠 していると思わ れる人 ・ぜんそくを起こ したことがある 人	1 日 1 回	l-メントール
		パスタイム ZX、 ZX-L(祐徳薬品 工業)	膏体 100g 中 2g	7×10cm1 枚、 L:10×14cm1 枚	15 才未満 は使用しな い	1 日 1 回 1～2 枚 (L は 1 日 1 回 1 枚貼付) ・1 回あたり 2 枚を 超えて使用しない (L は 1 回あたり 1 枚を超えて使用し ない) ・1 回あたり 24 時 間を超えて貼り続 けない ・連続して 2 週間 以上使用しない	・妊婦又は妊娠 していると思わ れる人 ・ぜんそくを起こ したことがある 人	1 日 1 回で 24 時間効 く。 微香性	l-メントール

	<医療用医薬品>	<一般用医薬品>							
有効成分	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
フェルビナク	セルタッチパップ 70、 パップ 140、セルタッ チテープ 70(帝國製 薬)	オムニードFBパ ップ(帝國製薬)	膏体 100g 中 0.7g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		オムニードFB温 プラスター(帝國 製薬)	膏体 100g 中 3.5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	温感	ノナン酸バニリ ルアミド
		オムニードFBプ ラスターα(帝國 製薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		オムニードFB温 プラスターα(帝 國製薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	温感	l-メントール、ノ ナン酸バニリ ルアミド
		オムニードフェル ビナク(帝國製 薬)	膏体 100g 中 0.5g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		オムニードフェル ビナク温感(帝國 製薬)	膏体 100g 中 0.5g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	温感	トウガラシエキ ス、l-メントー ル
		消炎鎮痛フェルビ ナクプラスターS (帝國製薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		ダイフィットエース FR テープ(帝國 製薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		ティプラスター FB5.0(帝國製 薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール

	<医療用医薬品>	<一般用医薬品>							
有効成分	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
(続き) フェルビナク	(続き) セルタッチパップ 70、パップ140、セル タッチテープ70(帝 國製薬)	リーバルパン FX プラスター α(帝 國製薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		リーバルパン FB パップ(帝國製 薬)	膏体 100g 中 0.7g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		レボルタ FX テー プ(帝國製薬)	膏体 100g 中 5g	7×10cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		サリスターFB パッ プ(帝國製薬)	膏体 100g 中 0.7g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		ティパップ FB(帝 國製薬)	膏体 100g 中 0.5g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人		l-メントール
		フェイタスシップ (久光製薬)	膏体 100g 中 0.7g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	微香性	l-メントール
		フェイタスシップ 温感(久光製薬)	膏体 100g 中 0.7g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	温感 微香性	トウガラシエキ ス
		フェイタス 5.0(久 光製薬)	膏体 100g 中 5g	レギュラー:7× 10cm1 枚、 大判:10× 14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	微香性	l-メントール
		フェイタス 5.0 温 感(久光製薬)	膏体 100g 中 5g	レギュラー:7× 10cm1 枚、 大判:10× 14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠している と思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	温感 微香性	l-メントール、ノ ニル酸ワニリ ルアミド

	<医療用医薬品>	<一般用医薬品>							
有効成分	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
(続き) フェルビナク	(続き) セルタッチパップ 70、 パップ 140、セルタッ チテープ 70(帝國製 薬)	パスタタイム FX シ ップ(祐徳薬品工 業)	膏体 100g 中 0.5g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠していると 思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	微香性	l-メントール
		パスタタイム FX7、 FX7-L、(祐徳薬 品工業)	膏体 100g 中 3.5g	7×10cm1 枚、 L:10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠していると 思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	微香性	l-メントール
		パスタタイム FX7 温感、FX7-L 温 感(祐徳薬品工 業)	膏体 100g 中 3.5g	7×10cm1 枚、 L:10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠していると 思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	温感	l-メントール、ノ ニル酸ワニリ ルアミド
		パスタタイム FX こ はる(祐徳薬品工 業)	膏体 100g(1m)中 5g	5.5×7.2cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 2 回まで (連続して 2 週間 以上使用しない)	・妊婦又は妊娠していると 思われる人 ・ぜんそくを起こしたことが ある人	ハーブ 系	l-メントール
フルルビプロフェ ン	ゼボラステープ 20mg、パップ 40mg、 パップ 80mg(三笠製 薬) ----- ヤクバンテープ 20mg、テープ 40mg、テープ 60mg (トクホン) ----- アドフィードパップ 40mg(リードケミカル)	該当商品なし							

	<医療用医薬品>		<一般用医薬品>						
有効成分	商品名	商品名	有効成分の含有量	サイズ	年齢制限	使用制限	使用しない	特徴	刺激成分
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	ロキソニンテープ 50mg、テープ 100mg、パップ 100mg、(リードケミカル)	ロイヒ膏ロキソプロ フェン、大判(ニチ バン)	膏体 100g 中 8.1g	7×10cm1 枚、 大判:10× 14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 1 回 (1 日当たり 4 枚 まで。大判は 1 日 当たり 2 枚まで) (連続して 2 週間 以上使用しない)	本剤又は他の解熱鎮痛 薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎 薬を使用してぜんそくを起 こしたことがある人	1 日 1 回使用	ノニル酸ワニリ ルアミド
		ロキソニン S テー プ、S テープ L (リ ードケミカル)	膏体 100g 中 5.67g	7×10cm1 枚、 L:10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 1 回 (1 日当たり 4 枚 まで。L は 1 日当 たり 2 枚まで) (連続して 2 週間 以上使用しない)	本剤又は他の解熱鎮痛 薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎 薬を使用してぜんそくを起 こしたことがある人	1 日 1 回使用	l-メントール
		ロキソニン S パッ プ(リードケミカ ル)	膏体 100g 中 1.134g	10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 1 回 (1 日当たり 2 枚 まで) (連続して 2 週間 以上使用しない)	本剤又は他の解熱鎮痛 薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎 薬を使用してぜんそくを起 こしたことがある人には使用 しない	1 日 1 回使用	ハッカ油
		ロキソニン EX テ ープ、EX テープ L(リードケミカル)	膏体 100g 中 8.1g	7×10cm1 枚、 L:10×14cm1 枚	15 才未満は 使用しない	1 日 1 回 (1 日当たり 4 枚 まで。L は 1 日当 たり 2 枚まで) (連続して 2 週間 以上使用しない)	本剤又は他の解熱鎮痛 薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎 薬を使用してぜんそくを起 こしたことがある人	1 日 1 回使用	

※ 本資料は 2022 年 12 月 21 日の時点で PMDA ホームページへ掲載されていた情報に基づいています。実際の使用は最新の添付文書をご確認ください

(作成:2023 年 2 月 21 日)